



**canvil**

Z SIARKĄ



# canvil

Canvil S jest szybko działającym nawozem do przedsięwzięcia oraz pogłównego nawożenia upraw rolniczych, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Siarka zawarta w Canvilu S jest ważnym składnikiem odżywczym, korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu.



● 1:1 przybliżona skala nawozu

Canvil S – prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy N (S) 27 (+12,0) azot całkowity (N) 27% (m/m)

- azot azotanowy 13,5% (m/m)
- azot amonowy 13,5% (m/m)

trinitlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (SO<sub>3</sub>) 12,0% (m/m) (= 4,8% m/m S)

## ZALETY

- granulowany mechanicznie nawóz azotowy o wyrównanej i wysokiej twardości granulek, sypkości oraz dobrej rozpuszczalności w wodzie
- optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotanowej (szybkodziałającej) oraz 50% w formie amonowej (wolnodziałającej zatrzymywanej przez kompleks sorpcyjny gleby)
- uniwersalny nawóz azotowy, stosowany przedsięwzięcia i pogłównie, do wszystkich roślin i rodzajów gleb, a szczególnie na gleby kwaśne
- zabezpieczony przed zbrylaniem
- zawiera siarkę zwiększającą efektywność nawożenia azotem
- zawartość siarki korzystnie wpływa na: poprawę kondycji roślin, wzrost ilości i jakości plonu (ziarna, bulwy, korzeni) oraz zawartość i jakość białka w roślinie

## Orientacyjne dawki nawozu

ROŚLINA DOCELOWA	DAWKI (kg/ha):		UWAGI
	JESIEŃ	WIOSNA	
Zboża ozime	60	250-500	dawka wiosenna dzielona
Zboża jare	-	300-440	dawka dzielona
Rzepak ozimy	70	500-700	dawka wiosenna dzielona
Ziemniak wczesny	-	220-300	przed sadzeniem
Ziemniak późny	-	350-550	dawka dzielona
Kukurydza	-	400-650	w dawkach dzielonych, dawki pogłównie dozować za pomocą aplikatorów międzyrzędowych
Burak cukrowy	-	350-520	dawka dzielona
Trwałe użytki zielone	60	380-700	pierwsza dawka po ruszeniu wegetacji, kolejne (następne) dawki kilka dni po (kolejnych) pokosach

